

## ANSIETAT PER SEPARACIÓ

L'ansietat per separació és un problema comportament que es dona en alguns animals quan se separen dels seus propietaris. Es manifesta de varies maneres i en general, pot consistir en la combinació dels següents símptomes :

- Vocalització excessiva (bordar, gemegar...)
- Micció i/o defecació inadequades
- Conducta destructiva envers mobles, portes, roba... M
- Menys freqüentment diarrea, vòmits o èczemes de llepatge

Aquests problemes es manifesten :

- Única i exclusivament quan el gos està sol
- Pràcticament sempre que el gos es queda sol
- 20 i 30 minuts després de la separació

El tractament té bon pronòstic sempre i quan hi sigui amb la combinació simultània de medicació i normes d'habitució.

### NORMES D'HABITUACIÓ

A CASA :

- Interaccionar amb el gos únicament per iniciativa del propietari i no al revés, i sempre que el gos estigui relaxat
- Acostumar al gos a quedar-se sol a casa de forma progressiva i cada cop períodes mes llargs de temps
- Simular les sortides varies vegades al dia i a diferents hores : posar-se l'abric, agafar les claus, el bolso, obrir la porta ....

AL SORTIR DE CASA :

- Ignorar totalment al gos durant 20-30 minuts abans de sortir de casa

AL ARRIBAR A CASA :

- Ignorar totalment al gos fins que es quedi tranquil i relaxat
- No castigar mai al gos de les destrosses o eliminacions inadequades que ha fet mentre no érem a casa.
- Si el problema es d'eliminacions inadequades ( orina o femtes ), no netejar-ho mai en presencia del gos.

